
Инструкции за употреба

Импланти от пласти и винтове

Тези инструкции за употреба не са
предназначени за разпространение в САЩ.

Инструкции за употреба

Импланти от плаки и винтове	VA-LCP система за травми на глезена 2,7/3,5
Системи от устройства, свързани с тези инструкции за употреба:	VA-LCP предна клавикуларна плака
2,4 mm канюлиран винт	VA-LCP кондиларна плака 4,5/5,0
2,4 mm LCP воларна екстрактикуларна система за дистален радиус с вариабилен ъгъл	VA-LCP плаки за дистален хумерус 2,7/3,5
2,4/2,7 mm заключващи тарзални плаки	VA-LCP фузионни плаки за медиална колона 3,5
Плаки с тъглови планки за възрастни	VA-LCP плаки за олекранон 2,7/3,5
Ангуларна стабилна X-плака и плака с 2 отвора	VA-LCP плака за проксимална тibia 3,5
Канюлириани винтове 3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3	VA заключваща интеркарпална фузионна система
DCP и LC-DCP системи	Фузионни LCP плаки с вариабилен ъгъл за 1-ва МТР 2,4/2,7
DHS/DCS система	LCP плака с вариабилен ъгъл за дорзален дистален радиус 2,4
Система за феморална шийка (FNS)	LCP система за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл 2,4/2,7
HCS 1,5	Мрежеста LCP плака с вариабилен ъгъл 2,4/2,7
HCS 2,4/3,0	LCP клиновидни плаки с отвори с вариабилен ъгъл 2,4/2,7
HCS 4,5/6,5	LCP тарзални плаки с вариабилен ъгъл 2,4/2,7
LCP антеролатерална дистална тибиялна пластина 3,5	LCP фузионни TMT плаки с вариабилен ъгъл 2,4/2,7
LCP клавикуларна плака с кука	LCP двуколонна плака за воларен дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4/2,7, свърхдълга
LCP компактна за крак/компактна за ръка	LCP плака с воларен рб за дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4
LCP компактна за ръка 1,5	Заключваща система за ръка с вариабилен ъгъл
LCP кондиларна пластина 4,5/5,0	
LCP DHHS	
LCP Dia-Meta воларни плаки за дистален радиус	
LCP плаки за дистална фибула	
LCP плаки за дистален хумерус	
LCP система за дистален радиус 2,4	
LCP плака за дистална тибия	
LCP плака за дистална улна	
LCP екстрактикуларна плака за дистален хумерус	
LCP плака с кука 3,5	
LCP заключваща компресионна плака	
LCP плаки за медиална дистална тибия с ниско огъване 3,5 mm	
LCP плака за медиална проксимална тибия 3,5	
LCP плака за медиална проксимална тибия 4,5/5,0	
LCP метафизична плака за дистална медиална тибия	
LCP метафизални плаки	
LCP плака за олекранон	
LCP педиатрична система от плака	
LCP периартикуларна плака за проксимален хумерус 3,5	
LCP плака за постериорна медиална проксимална тибия 3,5	
LCP проксимална феморална скриваща плака 4,5/5,0	
LCP проксимална феморална плака 4,5/5,0	
LCP плака за проксимален радиус 2,4	
LCP проксимална тибиялна плака 3,5	
LCP проксимална тибиялна плака 4,5/5,0 с инструменти за периартикуларно насочващо рамо	
LCP горна предна клавикуларна плака	
LCP горна клавикуларна плака	
LCP система за улнарна остеотомия 2,7	
LCP плаки за воларна колона на дистален радиус 2,4 mm	
LCP фузионен набор за китка	
LISS и LCP DF	
LISS и LCP PLT	
Заключваща прикрепваща плака	
Фузионен болт за средна част на ходилото Ø 6,5 mm	
Импланти и инструменти за таз	
PHILOS и PHILOS дълъг	
PHILOS с аугментация	
Плаки с квадрилатерална повърхност 3,5	
Корективни плаки за ротация 1,5 и 2,0	
Винтове за сакрум	
Система от винтове за епифизиолиза на бедрената глава (SCFE)	
Пружинни плаки 3,5	
Стандартен изместващ винт DHS със LCP странична плака DHHS	
Плаката за калканеус	
Заключващата плака за калканеус	
TomoFix	
TomoFix медиален дистален фемур (MDF)	
TomoFix медиална висока тибиялна плака (MHT)	
VA-LCP система за травми на глезена 2,7/3,5	
VA-LCP предна клавикуларна плака	
VA-LCP кондиларна плака 4,5/5,0	
VA-LCP плаки за дистален хумерус 2,7/3,5	
VA-LCP фузионни плаки за медиална колона 3,5	
VA-LCP плаки за олекранон 2,7/3,5	
VA-LCP плака за проксимална тibia 3,5	
VA заключваща интеркарпална фузионна система	
Фузионни LCP плаки с вариабилен ъгъл за 1-ва МТР 2,4/2,7	
LCP плака с вариабилен ъгъл за дорзален дистален радиус 2,4	
LCP система за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	
Мрежеста LCP плака с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	
LCP клиновидни плаки с отвори с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	
LCP тарзални плаки с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	
LCP фузионни TMT плаки с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	
LCP двуколонна плака за воларен дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4/2,7, свърхдълга	
LCP плака с воларен рб за дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4	
Заключваща система за ръка с вариабилен ъгъл	
Mоля, преди употреба прочетете внимателно тези указания за употреба и брошурата на Synthes "Важна информация". Уверете се, че познавате съответната хирургична техника.	
Импланти от плаки и винтове се състоят от различни плаки и винтове за имплантациите, които са опаковани единично и се предлагат нестериилни и/или стериилни (съответният номер на артикул с наставка "S"), както и в стериилна тръбна опаковка (съответният номер на артикул с наставка "TS").	
Важна бележка за медицински специалисти и персонал в операционната зала: Тези инструкции за употреба не включват цялата информация, необходима за избор и употреба на дадено изделие. Моля, вижте пълната документация за цялата необходима информация (съответния Наръчник за хирургична техника, Важна информация и специфичния за изделието етикет).	
Материал(и)	
Материал(и):	Стандарт(и):
Неръждаема стомана – 316L	ISO 5832-1
Неръждаема стомана – 22-13-5	ASTM F 1314
TiCP	ISO 5832-2
CoCrMo сплав	ISO 5832-12
Титанова сплав:	
Ti-6Al-7Nb (TAN)	ISO 5832-11
Ti-6Al-4V (TAV)	ISO 5832-3
Ti-15Mo	F 2066
Предназначение	
Импланти от плаки и винтове са предназначени за временна фиксация, коригиране или стабилизация на кости в различни анатомични области.	
Показания	
Моля, направете справка с таблицата в края на тези Инструкции за употреба.	
Противопоказания	
Моля, направете справка с таблицата в края на тези Инструкции за употреба.	
Потенциални рискове	
Както при всички големи хирургични процедури, могат да възникнат рискове, странични ефекти и нежелани събития. Въпреки че могат да възникнат много възможни реакции, някои от най-честите включват:	
Проблеми, възникващи вследствие на анестезията и позиционирането на пациента (напр. гадене, повръщане, дентални наранявания, неврологични увреждания и т.н.), тромбоза, емболия, инфекция, обилно кървене, ятрогенно увреждане на нерви или съдове, увреждане на меките тъкани, вкл. оток, образуване на абнормни цикатрикси, функционално увреждане на мускуло-скелетната система, болест на Sudeck, алергични реакции/реакции на свръхчувствителност и нежелани реакции, свързани с изпъкване на изделието, лошо свръзване, липса на свръзване.	

Стерилно изделие

STERILE R Стерилизирано с облъчване

Съхранявайте имплантите в оригиналната им защитна опаковка и не ги изваждайте от опаковката до момента непосредствено преди употреба. Да не се използва, когато опаковката е повредена.

Преди употреба проверете датата на срока на годност и се уверете в целостта на стерилната опаковка. Да не се използва, ако опаковката е повредена или е изтекъл срокът на годност.

 Да не се стерилизира повторно

Имплантируеми изделия, обозначени със символа "Да не се стерилизира повторно", не трябва да се стерилизират повторно, защото това може да наруши структурната целост на изделието и/или да доведе до неуспешното му функциониране. Повторната стерилизация на имплантируемите изделия може да доведе до нестерилен продукт и/или неотговаряне на спецификациите му за работа и/или да променят свойства на материала.

Изделие за еднократна употреба

 Да не се използва повторно

Показа медицинско устройство, предназначено за еднократна употреба или за употреба при един пациент по време на една процедура.

Повторната употреба или клинична повторна обработка (напр. почистване и повторна стерилизация) може да наруши структурната целост на изделието и/или да доведе до неизправност на изделието, което може да причини нараняване, болест или смърт на пациента.

Освен това, повторната употреба или обработка на изделия за еднократна употреба може да създаде рисък от контаминация, напр. вследствие на пренасяне на инфекциозен материал от един пациент към друг. Това би могло да доведе до нараняване или смърт на пациента или потребителя.

Замърсените импланти не трябва да се обработват повторно. Всеки продукт на Synthes, който е бил замърсен с кръв, тъкан и/или телесни течности/материи, никога не трябва да се използва повторно и с него трябва да се борави в съответствие с протокола на болницата. Въпреки че може да изглеждат незасегнати, имплантите може да имат малки дефекти и вътрешни напрежения, които могат да причинят умора на материала.

Предпазни мерки

За общи предпазни мерки направете справка във "Важна информация".

За специфични за приложението предпазни мерки, свързани с импланти плаки и винтове, е задължително да направите справка във съответния Наръчник за хирургична техника (www.depuySynthes.com/ifu) на системата от продукти, която се използва.

Предупреждения

За общи предупреждения направете справка във "Важна информация".

За специфични за приложението предпазни мерки, свързани с имплантите от плаки и винтове, е задължително да направите справка със съответния наръчник за хирургична техника (www.depuySynthes.com/ifu) на използваната система от продукти.

Комбинация от медицински изделия

Synthes не са тествали съвместимостта с изделия, предоставени от други производители, и не поема отговорност в такива случаи.

Магнитно резонансна среда

Когато дадено изделие е оценено за употреба в МР среда, информацията за ЯМР може да се намери в хирургичната техника на www.depuySynthes.com/ifu.

Третиране преди употреба на изделията

Продуктите на Synthes, доставяни в нестерилен състояние, трябва да се почистват и стерилизират с пара преди хирургична употреба. Преди почистване отстранете напълно оригиналната опаковка. Преди парна стерилизация поставете продукта в одобрена обвивка или контейнер. Следвайте инструкциите за почистване и стерилизация, дадени от Synthes във "Важна информация".

Клинична обработка/повторна обработка на изделията

Подробни указания за обработка на имплантите и повторна обработка на изделията за многократна употреба, таблите и кутиите за инструменти, са дадени в брошурата на Synthes "Важна информация". Инструкциите за слобяване и разглобяване на инструментите "Разглобяване на инструменти, съставени от много части" могат да се изтеглят от <http://emea.depuySynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Системи	Показания	Противопоказания
2,4 mm канюлиран винт	<ul style="list-style-type: none">- Вътреставни фрактури на карпалите, метакарпалите, тарзалите и метатарзалите- Фиксация на фрагментите на малките стави- Бунионектомия и остеотомия- Артродеза на малки стави	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
2,4 mm LCP воларна екстравтикуларна система за дистален радиус с вариабилен ъгъл	2,4 mm LCP воларните екстравтикуларни плаки за дистален радиус с вариабилен ъгъл са предназначени за фиксация на вътрешните и външните ставни фрактури и остеотомии на дисталния радиус.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
2,4/2,7 mm заключващи тарзални плаки	2,4 mm/2,7 mm заключващи тарзални плаки на Synthes са предназначени за фиксация на фрактури, остеотомии, липси на свързвания, реплантации и фузии на кубоидната, тарзалната и навикната кост, особено при остеопеничната кост.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Плаки със 130° ъглова плака за възрастни	Плака със 130° ъглова плака Фрактури и ревизии на проксималната трета на бедрената кост при скелетно зрели пациенти.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
	Кондиларни плаки, 95° Фрактури и ревизии на проксималната и дисталната трета на бедрената кост при скелетно зрели пациенти.	
	Остеотомни плаки 90°/100°/110°/120°/130° Плаки за остеотомии на бедрена остеотомия на проксималната бедрена става при скелетно зрели пациенти.	

Системи	Показания	Противопоказания
Ангуларна стабилна X-плака и плака с 2 отвора	<p>X-плака</p> <p>Артродеза</p> <ul style="list-style-type: none"> - МТР - МТС - Талоновикуларен - Калканео-кубичен <p>Проксимални остеотомии</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сърповидни - Лъдлоф - May - Клиновидни с отвор - Клиновидни, затворени <p>Фрактури с калканеални остеотомии</p> <ul style="list-style-type: none"> - Единична - Многофрагментна <p>Плака с 2 отвора</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нетипична остеотомия 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Канюлирана педиатрична остеотомична система (CAPOS)	<p>Системата CAPOS е предназначена за употреба при бебета, малки деца, деца, юноши и възрастни пациенти с нисък ръст.</p> <p>Специфичните указания включват:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Интертрохантерно деротиране и варусна остеотомия <p>Плаки за остеотомия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини бедрена плака за бебета, бедрена плака за бебета 3,5, 90°, бедрена плака за деца 3,5, 90°, бедрена плака за деца 4,5, бедрена плака 80°, 90° и 100° (за юноши) - Плаки за интертрохантерни валгусни остеотомии - 95° кондиларни плаки (за юноши и възрастни пациенти с нисък ръст) - Фрактури на феморалната шийка и пертрохантерни фрактури - Плаки – 130° плаки с щглова планка (за юноши и възрастни пациенти с нисък ръст) 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Канюлирани винтове 3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3	<p>CSS 3,0</p> <p>Фиксация на фрактури на предмишиницата, ръката и крака, и т.н.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фрактури и артродези на карпалите и метакарпалите - фрактури на дисталния радиус и радиалната глава - метатарзални фрактури <p>CSS 3,5</p> <p>Фиксация на фрактури с малки фрагменти, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фрактури на китката - метакарпеларни и метатарзални фрактури и фиксирации инметакарпални и метатарзални остеотомии - тарзални фрактури - транскондиларни хумерални фрактури при децата <p>CSS 4,0</p> <p>Фиксация на фрактури със средни фрагменти, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тарзални и метатарзални фрактури и фиксации при метатарзалните фалангали остеотомии - тарзометатарзални и метатарзофалангеални артродези - фиксации на сухожилията - корекции на халукс валгус <p>CSS 4,5</p> <p>Фиксация на фрактури със средни фрагменти, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - малеоларни фрактури - фрактури на тибиалния пилон - фрактури на калканеуса и талуса - фрактури на тибиалното плато - карпални и тарзални артродези <p>CSS 6,5, 7,0 и 7,3</p> <p>Фиксация на фрактури с големи фрагменти, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на феморалната шийка - Интеркондиларни феморални фрактури - Епифизиолиза на феморалната глава - Артродеза на глезена - Илиоскрални размествания 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.

Системи	Показания	Противопоказания
DCP и LC-DCP системи	<p>Тази хирургична техника се прилага за DCP и LC-DCP системите и пластичните линии на Synthes по-долу:</p> <p>Система от много малки фрагменти 1,5, 2,0, 2,7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на средните и дисталните фаланги и тарзали - Фрактури на метакарпалите и метатарзалите - Остеотомии и артрози на ръката и крака - Фрактури с дистален радиус (техника с двойна плака) <p>Компактна ръка 1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,4</p> <p>Размери на импланта 1,0/1,3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фиксация на малките фрагменти - Фрактури на дисталните и интермедиалните фаланги - Фрактури с откъсване <p>Размери на импланта 1,5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на фалангите и метакарпалите - Заснемане на фрагменти с техника на изоставане <p>Размери на импланта 2,0/2,4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на фалангите и метакарпалите - Заснемане на фрагменти с техника на изоставане <p>Пластини с формата на детелина 3,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дистална тibia за раздробени фрактури, които да подкрепят медиалната ѝ страна - Проксимален хумерус за раздробени фрактури на рамото на главата <p>Една трета тубуларна плака 3,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на костите с по-малък диаметър като фибулата, раменната кост и лакътната кост. <p>LC-DCP плака 3,5, DCP плака 3,5, T-плака 3,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фиксация на фрактура и фиксация след например остеотомии, лоши сливания, липса на слиивания, включващи, но не ограничаващи се до дистален радиус, проксимална и дистална тibia, проксимален хумерус и ключицата. <p>LC-DCP плака 4,5, DCP плака 4,5, T-плака 4,5, T-подпорна плака 4,5, L-подпорна плака 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури и остеотомии на големи кости като бедрената кост, тибията и хумеруса <p>Полу-тубуларна плака 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури и остеотомии на костите с по-малки размери като хумеруса, радиуса, лакътната кост, ключицата, фибулата, тибията и таза <p>Кондиларна подпорна плака 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подпорна и многофрагментна фрактура на дисталната бедрена кост - Супракондиларни фрактури - Вътрешни и външноставни кондиларни фрактури - Лоши свързвания и липси на свързвания на дисталната бедрена кост - Перипротезни фрактури <p>Главна подпорна плака на страничната тibia 4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предназначена за стабилизация на фрактурите на проксималната тibia. <p>Те включват фрактури на проксималния вал, метафизеални фрактури, вътрешноставни фрактури, перипротезни фрактури.</p> <p>Проксимална тибиялна плака 4,5</p> <p>Предназначена за липса на свързвания, лоши свързвания и фрактури на проксималната тibia, включително обикновен, натрошен и страничен клин, вдълбване, междинен клин, двойнокондиларни фрактури и комбинирани фрактури от странични клинове и вдълбвания.</p>	<p>Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.</p>
DHS/DCS система	<p>DHS включва всички комбинации от DHS винт, DHS острие, DHS пластина с DCP отвори, LCP DHS пластина и LCP DHS с яка.</p> <p>DHS индикации</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пертохантерни фрактури от тип 31-A1 и 31-A2 - Интertoхантерни фрактури от тип 31-A3 - Фрактури на феморалната шийка 31-B (DHS винт заедно с винт против завъртане) - Субтохантерни фрактури <p>Индикации за трохантерно стабилизираща плака LTSP/ULTSP/TSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нестабилни петрохантерни фрактури от тип 31-A2 и 31-A3 особено фрактури с множество елементи с отделен и надължно разделен по-голям трохантер <p>DCS индикации</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проксимална бедрена става: Много проксимално разположени, изцяло субтохантерни фрактури от типове 32-A и 32-B - Дистална бедрена става: Фрактури от тип 33-A (извънставни, суперкондиларни) и фрактури от тип 33-C (изцяло артикуларни фрактури) 	<p>DHS противопоказания</p> <p>DHS не трябва да се използва в случаите, при които има високо разпространение на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сепсис - Първично злокачествени или метастатични тумори - Материално чувствителни - Съдово компроментирани <p>DCS противопоказания</p> <p>- Пертохантерни фрактури или трохантерни фрактури със субtroхантерно разширение (31-A3)</p>

Системи	Показания	Противопоказания
Система за феморална шийка (FNS)	Фрактури на феморалната шийка (AO тип 31-B)	<ul style="list-style-type: none"> - Пертрохантерни фрактури (AO тип 31-A1 и 31-A2) - Интертрохантерни фрактури (AO тип 31-A3) - Субтроментарни фрактури
		В допълнение тази система трябва да се използва за случаи, при които има високо разпространение на: <ul style="list-style-type: none"> - Сепсис - Първично злокачествени или метастатични тумори - Материално чувствителни - Съдово компроментирани
HCS 1,5	<ul style="list-style-type: none"> - Фиксация на вътрешно и външно ъглови фрактури и липса на сливания на малките кости и фрагменти на малките кости - Артродеза на малките стави - Остеохондрални фрактури - Остеотомии - Фрактури с откъсване 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
HCS 2,4/3,0	<ul style="list-style-type: none"> - Фиксация на вътрешно и външно ъглови фрактури и липса на сливания на малките кости и фрагменти на малките кости - Артродеза на малките стави - Буниюнектомии и остеотомии <p>Примерите включват, но не се ограничават до скапоидни и други карпални кости, метакарпали, тарзали, метатарзали, коленни капачки, улнарен стилоид, капителум, радиална глава и радиален стилоид.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
HCS 4,5/6,5	HCS 4,5 Фрактури, остеоартрити или деформации на малките и големите кости. Примери: <ul style="list-style-type: none"> - Калканеус - Кост на талус - Метатарзус - Дистална и проксимална тибия - Дистална бедрена става - Проксимален хumerус HCS 6,5 Фрактури, остеоартрити или деформации на малките и големите кости. Примери: <ul style="list-style-type: none"> - Калканеус - Кост на талус - Дистална и проксимална тибия - Дистална бедрена става 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP антеролатерална дистална тибионала пластина 3,5	LCP антеролатералната плака за дистална тибия 3,5 е предназначена за: <ul style="list-style-type: none"> - Външноставна и обикновена вътрешно ставна фрактура на дисталната тибия - Фрактура на дисталната тибия, подкожна и редуцирана от ограничена артромия - Фрактура на дисталната тибия, разширяваща се към диафизалната зона 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP клавикуларна плака с кука	<ul style="list-style-type: none"> - Фрактура на страничната ключица: Neer тип II или Jäger и Breitner тип II - Разместяване на акромиоклавиуларната става тип: Tossy III или Rockwood III към V 	<ul style="list-style-type: none"> - Стабилни фрактури на страничната ключица - Tossy тип I и II - Rockwood тип I и II - Остра инфекция
LCP компактна за крак/ компактна за ръка	Индикаторите за имплант с размери 2,0 и 2,4 включват: <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на фалангите - Фрактури на метакарпалите и метатарзалите (II-V) - Фрактури на дисталния радиус (техника с двойна пластина) - Остеотомии и артродези на ръката и стъпалото (напр. TMT [II-V] фузии) - Субкапитална радиална главна фрактура - Като допълнителен имплант с малки фрагменти Индикациите за имплант с размер 2,7 включват: <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на метатарзалата I - Фрактури на тарзалите - MTP 1 фузии - Остеотомии и артродези на тарзалите (напр. калкано-кубоидална фузия) 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.

Системи	Показания	Противопоказания
LCP компактна за ръка	<p>Компактна ръка 1,0/1,3</p> <p>Общо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фиксация на малките фрагменти - Фрактури с разкъсане и фрактури на дисталните и средните фаланги <p>Права плака:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на вала на фалангите <p>Подпорна пластинка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Продължени фрактури и репланации на средните и проксималните фаланги на Т-плака и <p>Y-плака:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кондиларни фрактури на фалангите <p>Единични кортексови винтове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заснемане на фрагменти с техника на изоставане <p>LCP компактна за ръка 1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фиксация на фрактури на фалангите и метакарпалите - Остеотомии - Артродеза - Репланации и реконструкции на фалангите и метакарпалите, особено при остеопеничната кост <p>LCP компактна за ръка 2,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на фалангите, меракрепалите и костите на китката - Остеомити и артродези на интерфалангейлните стави - Фрактури на дисталния радиус (техника с двойна плака) - Субкапитални радиални главни фрактури <p>LCP компактна за ръка 2,4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на меракрепалите и костите на китката - Фрактури на дисталния радиус (техника с двойна плака) - Остеотомии и артрози на ръката - Субкапитални радиални главни фрактури 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP компактна за ръка 1,5	<ul style="list-style-type: none"> - Фиксация на фрактури на фалангите и метакарпалите - Остеотомии - Артродеза - Репланации и реконструкции на фалангите и метакарпалите, особено при остеопеничната кост 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP кондиларна пластинка 4,5/5,0	<ul style="list-style-type: none"> - Подпорна и многофрагментна фрактура на дисталната бедрена кост - Супракондиларни фрактури - Вътрешноставни и външноставни кондиларни фрактури - Лоши свързвания и липси на свързвания на дисталната бедрена кост - Перипротезни фрактури - Фрактури при нормални и остеопенични кости 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP DHHS	<p>LCP DHHS е предназначен за следните фрактури на проксималната бедрена кост:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Интеррохантерни фрактури - Фрактури на феморалната шийка - Пертохантерни фрактури <p>LCP DHHS е предназначен за стабилни и нестабилни фрактури, при които се препоръчва стабилна медиална подpora.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP Dia-Meta воларни плаки за дистален радиус	LCP Dia-Meta воларните пластини с дистален радиус са предназначени за фрактури, остеотомии и липси на свързвания на радиус.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плаки за дистална фибула	LCP Плаките на дисталната фибула са предназначени за фиксация на фрактури, остеотомии и липса на свързвания на метафизеалната и диафизеалната област на дисталната фибула, особено на остеопеничната кост.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плаки за дистален хумерус	<p>Предназначения за плаката на дисталния хумерус</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вътрешноставни фрактури на дисталния хумерус - Супракондиларни фрактури на дисталния хумерус - Липса на свързвания на дисталния хумерус 	<p>(за DHP за Метафизеална плака)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Остри инфекции - Деца във фаза на растеж
LCP система за дистален радиус 2,4	Размествания при фрактурите на външноставния и вътрешноставния дистален радиус и корективните остеотомии на дисталния радиус.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Дорзален походд		
<ul style="list-style-type: none"> - Дорзално разместени фрактури - Външноставни фрактури с метафизеален дефект (AO класификация 23-A3) - Реконструкция на отворената става (AO класификация 23-C1, C2, C3) - Комбинация от дистален радиус с карпални и метакарпални фрактури - Корективни остеотомии, дланен подход – Обърнат Barton - Дланно разместени външноставни фрактури (Goyrand- Smith) - Дорзално разместени външноставни фрактури (Colles) и артикуларни фрактури - Външноставни фрактури с разширение към вала (много дълги пластини) 		

Системи	Показания	Противопоказания
LCP плака за дистална тибия	<ul style="list-style-type: none"> - Външноставна и обикновена вътрешноставна фрактура на дисталната тибия - Фрактури на дисталната тибия, подкожни или редуцирани от ограничена артромия - Фрактура на дисталната тибия, разширяваща се към диафизалната зона 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плака за дистална улна	<p>Фрактури на дисталната лакътна кост в резултат на нестабилност на дисталната радиоулнарна става.</p> <p>Фрактури на улнарната глава, при които артикуларната повърхност е или разместена, или завъртяна, или наклонена.</p> <p>Раздробени външноставни фрактури на шийката на лакътната кост, заплашваща съгласуването на стабилността на дисталната радиоулнарна става.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP екстраартикуларна плака за дистален хумерус	<ul style="list-style-type: none"> - Външноставни фрактури на дисталния хумерус - Липса на свързвания на дисталния хумерус - Липса на свързвания на дисталния хумерус 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плака с кука 3,5	<ul style="list-style-type: none"> - Прости фрактури на олекранона (АО типове 21-B1, 21-B3, 21-C1) - Остеотомии на олекранона за лечение на фрактура на дисталния хумерус - Фрактури с разкъсване на дисталната тибия и фибула 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP заключваща компресионна плака	<p>Плака за малки фрактури (3,5)</p> <p>LCP плаки 3,5</p> <p>Фиксация на фрагменти на малките кости чрез употребата на петте стандартни АО принципа за поставяне на плаки (плака за подпора, неутрализираща плака, плака с обтягащ винт, свързваща плака, компресираща плака).</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плака за реконструкция 3,5	<p>Фиксация на фрагменти на малките кости чрез употребата на петте стандартни АО принципа за поставяне на плаки (плака за подпора, неутрализираща плака, плака с обтягащ винт, свързваща плака, компресираща плака). Фиксация на фрактура и фиксацията след остеотомии, лоши сливания, липса на сливания, като например включващи, но не ограничаващи се до дистален радиус, проксимална и дистална тибия, проксимален хумерус и ключицата.</p>	
LCP една трета тубуларна плака 3,5	<p>LCP една трета тубуларните плаки 3,5 са предназначени за поставяне на плаки при фрактури на дългите и малки кости. Плаката трябва да се използва само за целина споделяне на товара, като например поддръжка, обвързване на напрежението, неутрализация или компресия.</p>	
LCP метафизални 3,5	<p>LCP метафизалните плаки са предназначени за поправяне на външноставни фрактури в метафизалната област, които могат да се разширят до зоната на вала. 3,5 mm плаки са предназначени за фиксация на фрактури на дисталния хумерус и дисталната фибула.</p>	
Плаки за големи фрагменти (4,5/5,0)		
LCP метафизални 3,5/4,5/5,0	<p>LCP метафизалните плаки са предназначени за външноставни фрактури в метафизалната област, които могат да се разширят до зоната на вала. 3,5 mm плаки са предназначени за фиксация на фрактури на дисталния хумерус и дисталната фибула.</p>	
LCP 4,5/5,0 тесни плаки		
LCP Т-плаки 4,5/5,0		
LCP 4,5/5,0 широки плаки		
LCP 4,5/5,0 широки криви плаки		
LCP плаки за реконструкция 4,5/5,0		
LCP плаки за медиална дистална тибия с ниско огъване 3,5 mm	<p>Като цяло LCP генеричните плаки и инструменти (за големи фрагменти) са предназначени за остеосинтеза на фрактури при тазобедрената става, тибията, хумеруса и таза в проксималните, дисталните и валовите зони.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плака за медиална проксимална тибия 3,5	<p>LCP плаките за ниско огъната медиална дистална тибия на Synthes са предназначени за фиксация на сложни вътрешно и външноставни фрактури и остеотомии на дисталната тибия като част от LCP системата за малки фрагменти на Synthes.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP медиални проксимални тибиилни плаки 3,5	<p>LCP медиалните проксимални тибиилни плаки 3,5 са предназначени да поддържат метафизалните фрактури на медиалното тибиално плато, фрактурите от разделен вид на медиалното тибиално плато, фрактурите с медиално разделяне със свързани вдълбвания или разделяния, или фрактурите за вдълбване на медиалното тибиално плато.</p> <p>Плаките може също така да се използват за фиксация на проксималната четвърт (латерална и медиална) на тибията, както и като сегментни фрактури на проксималната тибия.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.

Системи	Показания	Противопоказания
LCP плаха за медиална проксимална тибия 4,5/5,0	<p>LCP медиалните проксимални тибиялни плаки 4,5/5,0 са предназначени да поддържат метафизалните фрактури на медиалното тибиялно плато, фрактурите от разделен вид на медиалното тибиялно плато, фрактурите с медиално разделяне със свързани вдълбвания и разделяния или фрактурите за вдълбане на медиалното тибиялно плато. Плаките може също така да се използват за фиксация на проксималната четвърта (латерална и медиална) на тибиата, както и като сегментни фрактури на проксималната тибия.</p> <p>LCP медиалните проксимални тибиялни плаки 4,5/5,0 могат също така да се използват за фиксация на липса на свързване или лошо свързване на медиалната проксимална тибия и тибиален вал, както и за отворени и затворени клинообразни тибиялни остеотомии.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP метафизална плаха за дистална медиална тибия	<p>LCP метафизалната плаха за дистална медиална тибия е предварително оформена плаха, която позволява оптимално лечение на съпоставените ставни фрактури на дисталната тибия, разширявачи се към зоната на вала. Тази плаха приема взема предвид следните характеристики на дисталната тибия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тънко, меко покритие на тъкната - Сложна анатомична форма на костта 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP метафизални плаки	<p>LCP метафизалните плаки са предназначени за поправяне на външноставни фрактури в метафизалната област, които могат да се разширят до зоната на вала, 3,5 mm плаки са предназначени за фиксация на фрактури на дисталния хумерус и дисталната фибула. 4,5/5,0 плаки са предназначени за фиксация на фрактури на проксималния хумерус и дисталната тибия.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плаха за олекранон	<ul style="list-style-type: none"> - Сложна външно или вътрешноставна олекранна фрактура - Псевдоартирит на проксималната улна - Остеотомии - Проста фрактура на олекранона 	<ul style="list-style-type: none"> - Остри инфекции - Деца във фаза на растеж
LCP педиатрична система от плаки	<p>LCP педиатричната система от плаки се състои от различни плаки за различни показания.</p> <p>LCP педиатрична система от плаки 2,7 е предназначена за употреба при бебета до три години в зависимост от теглото на тялото и качеството на костта.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пренебрежнато разместяване на бедрото в комбинация с отворена редукция - Развиваща се кокса валга - Тежка дисплазия на бедрото <p>LCP педиатрична бедрена плаха за варус остеотомия е предназначена за употреба при педиатрични пациенти до юношество и за възрастни пациенти с нисък ръст.</p> <p>Специфичните указания включват:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Идиопатично валгусно бедро - Идиопатична и придобита сублуксация на главата на тазобедрената става - Сублуксация на главата на тазобедрената става при нервномускулно заболяване/проблем - Висока ретроверсия и антроверсия в комбинация с висок CCD тъгъл <p>LCP педиатрична бедрена плаха за варус остеотомия е предназначена за употреба при педиатрични пациенти до юношество и за възрастни пациенти с нисък ръст.</p> <p>Специфичните указания включват:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Високо свиване на по-големия трохантър и ниско скъсяване на крака - Болестта на Perthes - Конгенитален псевдоартирит на шийката на бедрената кост - Деформация на SCFE (Изместен капитал на епифизата на тазобедрената кост) - PFFD (Проксимален фокален дефицит на тазобедрената кост) - Идиопатична кокса vara - Посттравматичен псевдоартирит на феморалната шийката <p>LCP Педиатрична бедрена плаха (3,5 & 5,0) 120° & 130° за лечение на фрактура и корекция на въртенето е предназначена за транstroханични фрактури с достатъчно медиална поддръжка и фрактури на феморалната шийка тип I до III (вижте AO класификацията за фрактури).</p> <p>LCP педиатрична кондиларна плаха е предназначена за употреба при педиатрични пациенти до юношество и за възрастни пациенти с нисък ръст.</p> <p>Специфичните указания включват:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фиксирана гъвкава структура на коляното при неврологични състояния - Корекция на деформацията при дисталната бедрена става - Ротационно разцентроване на бедрената става (ако се предпочита дистална корекция) - Супракондиларни фрактури на бедрената става 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP периартикуларна плаха за проксимален хумерус 3,5	<p>LCP околоствината плаха на проксималния хумерус 3,5 се обръща към сложните фрактури на проксималния хумерус.</p> <p>3,5 mm LCP околоствината плаха на проксималния хумерус е предназначена за фрактури и фрактурни разместявания (Neer тип 2, 3, и 4-частови фрактури), остеотомии и липса на свързания на проксималния хумерус, особено за пациенти, страдащи от остеопороза.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.

Системи	Показания	Противопоказания
LCP плака за постериорна медиална проксимална тибия 3,5	LCP постериорната плака на медиалната проксимална тибия 3,5 на Synthes е предназначена за вътрешна фиксация на фрактури на постериомедиалната проксималната тибия, включително поддържащи фрактури на проксималните, дисталните и метафизалните зони на тибията.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP проксимална феморална скриваща плака 4,5/5,0	LCP проксималната феморална скрита плака 4,5/5,0 е предназначена за фрактури на тазобедрената става, включително: – Фрактури на трохантерния район, трохантерната проста, цервикотрохантерната, трохантернодиафизалната, мултифрагментарната пертрохантерна, интертрохантерна, обръната и напречна фрактури в трохантерната област или с допълнителна фрактура на медиалния кортекс – Фрактури на проксималния край на бедрената става, комбинирани с фрактури на ипсилатералния вал – Метастатични фрактури на проксималната бедрена става – Остеотомии на проксималната бедрена става – Също за употреба при фиксация на остеопатична кост и фиксация на липса на свързвания и лоши свързвания – Перипротезни фрактури	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP проксимална феморална плака 4,5/5,0	LCP проксималната феморална плака 4,5/5,0 е предназначена за фрактури на бедрената става, включително: – Фрактури на трохантерния район, трохантерната проста, цервикотрохантерната, трохантернодиафизалната, мултифрагментарната пертрохантерна, интертрохантерна, обръната и напречна фрактури в трохантерната област или с допълнителна фрактура на медиалния кортекс – Фрактури на проксималния край на бедрената става, комбинирани с фрактури на ипсилатералния вал – Метастатични фрактури на проксималната бедрена става – Остеотомии на проксималната бедрена става – Също за употреба при фиксация на остеопатична кост и фиксация на липса на свързвания и лоши свързвания – Перипротезни фрактури	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плака за проксимален радиус 2,4	Външноставни и вътрешноставни фрактури на проксималния радиус и мултифрагментирани фрактури на феморалната шийка.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP проксимална тибионална плака 3,5	– Разделени фрактури на страничното тибионално плато – Страницни разделени фрактури със свързани вдълбвания – Фрактури на чисти централни вдълбвания – Разделени и вдълбнати фрактури на медиалното плато	Фрактури на изолирания вал.
LCP проксимална тибионална плака 4,5/5,0 с инструменти за периартикуларно насочващо рамо	LCP Проксималните тибионални плаки 4,5/5,0 на Synthes са предназначени за лечение на липса на свързвания, лоши свързвания и фрактури на проксималната тибия, включващи: – Прости фрактури – Фрактури от раздробяване – Фрактури с латерален клин – Вдълбнати фрактури – Фрактури с медиален клин – Бикондиларни, комбинация от фрактури с латерален клин и вдълбнати фрактури – Фрактури със свързани фрактури на вала	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP горна предна клавикуларна плака	– Фрактури на вала на ключицата – Фрактури на латералната ключица – Лоши свързвания на ключицата – Липса на свързвания на ключицата	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP горна клавикуларна плака	– Фрактури на вала на ключицата – Фрактури на латералната ключица – Лоши свързвания на ключицата – Липса на свързвания на ключицата	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP система за улнарна остеотомия 2,7	Основен улнарен синдром на затягането – Дегенеративни разкъсвания на триъгълен фиброрхущилен комплекс (TFCC) – Лунотрикетрални разкъсвания Вторичен улнарен синдром на затягането – Несъответствие (неотговаряща дължина) на дисталната радиалноулнарна става, последваща фрактура на дисталния радиус – Травматични разкъсвания на триъгълен фиброрхущилен комплекс (TFCC)	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плаки за воларна колона на дистален радиус 2,4 mm	LCP колоните воларните плаки за дистален радиус 2,4 са предназначени за фиксация на вътрешно и външноставните фрактури и остеотомии на дисталния радиус.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP фузионен набор за китка	LCP системата за фузия на китката е предназначена за артродеза на китката и фрактури на другите малки кости на костите на китката. Специфичните указания включват: – Посттравматична артроза на ставите на китката – Ревамтични деформации на китката, изискващи възстановяване – Сложна карпала нестабилност – Постсептичен артрит на китката – Тежка непрестанна болка в китката, свързана с движение – Парализа на нервите на брахиалния плексус – Туморна ресекция – Спастични деформации	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.

Системи	Показания	Противопоказания
LISS и LCP DF	LCP DF е предназначен за стабилизация на фрактурите на дисталния фемур. Това включва: – Дистални осеви фрактури – Супракондиларни фрактури – Вътрешноставни фрактури – Перипротезни фрактури	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LISS и LCP PLT	LCP PLT и LISS PLT са предназначени за стабилизация на фрактурите на проксималната тibia. Това включва: – Фрактури на проксималния вал – Метафизални фрактури – Вътрешноставни фрактури – Перипротезни фрактури	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Заключваща прикрепваща плака	– Фрактури на околовставния вал на тазобедрената кост: – Ванкувър B – Ванкувър C – Фрактури около интрамедуларните импланти	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Фузионен болт за средна част на ходилото Ø 6,5 mm	Лечение на големия колапс на средна/задната част на ходилото, свързан: – Ходило на Шаркот – Невропатично заболяване	– Заболяване на периферния съд – Серииозни животозастрашаващи съпътстващи заболявания
Импланти и инструменти за таз	<p>Фрактури на симфизата: – Плаки на срамната кост</p> <p>Фрактури на тазови ръб: – Реконструктивни плаки – Права плака – Извита плака (88 mm радиус, 108 mm радиус) – J-плака</p> <p>– Заключваща реконструктивна плака 3,5 – Права плака – J-плака</p> <p>– Реконструктивна плака 3,5 с широк ъгъл – Права плака</p> <p>Фрактури на илиума/илиачното крило: – Плаки за реконструкция – Права плака – Извита плака (88 mm радиус, 108 mm радиус)</p> <p>– Заключваща реконструктивна плака 3,5 – Права плака</p> <p>– Реконструктивна плака с нисък профил 3,5 с широк ъгъл – Права плака</p> <p>Ацетабулумни фрактури: – Реконструктивни плаки – Права плака – Извита плака (88 mm радиус, 108 mm радиус)</p> <p>– Реконструктивна плака 3,5 с широк ъгъл – Права плака</p>	<p>Инструменталните плаки за контуриране на място са противопоказани за*. Плаки със заключващи и коаксални комби дупки. В частност:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Заключваща реконструктивна плака 3,5 – Плаки на срамната кост 3,5 – Пружинни плаки 3,5 – Реконструктивни плаки 3,5 без коаксални комби отвори – Други плаки, размери от 3,5 mm

Системи	Показания	Противопоказания
PHILOS и PHILOS дълъг	<p>PHILOS предназначения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разместени две, три и четири фрагментови фрактури на проксималния хумерус, включително фрактури засягащи остеопеничната кост - Псевдоаррози на проксималния хумерус - Остеомити на проксималния хумерус <p>PHILOS дълъг, предназначения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Относно PHILOS, но за фрактури, разширяващи се към вала без медиална поддръшка 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
PHILOS с аугментация	<p>PHILOS предназначения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разместени две, три и четири фрагментови фрактури на проксималния хумерус, включително фрактури, засягащи остеопеничната кост - Псевдоаррози на проксималния хумерус - Остеомити на проксималния хумерус <p>PHILOS дълъг, предназначения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Както при PHILOS, но за фрактури, разширяващи се към вала или без медиална поддръшка <p>PHILOS аугментация, предназначения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Както при PHILOS и PHILOS дълъг, но изключително заедно с остеопоротичната кост - Предварително перфорираните винтове може да се използват без циментова аугментация 	<p>PHILOS аугментация, противопоказания</p> <ul style="list-style-type: none"> - В случаите, при които има рисък от изтичане на цимент към ставните празнини, артикуларните или вакууларните структури (например чрез фрактури, които са отворени към ставните съединения)
Плаки с квадрилатерална повърхност 3,5	Плаките за четириъгълни повърхности 3,5 на Synthes са предназначени за раздробяване на четириъгълните повърхности, свързано с ацетабуларните фрактури, когато се използват заедно с плаките за тазови реконструкции на Synthes.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Корективни плаки за ротация 1,5 и 2,0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Всички фрактури на фалангите и метакарпалите, когато точното репозициониране е трудно или когато може лесно да възникне ротационна грешка. - Субакапитални фрактури на метакарпалите (при фрактури с дадено засегнато вдълбване) - Напречни фрактури - Къси наклонени фрактури - Фрактури от раздробяване - Дефектни фрактури (наранявания от кръгови разрези) - Фрактури от ампутации на пръстите (с основно скъсяване) - Winterstein фрактура, Rolando фрактура <p>2. Корективни остеотомии за фрактури на фалангите или метакарпалите, които са излекувани с осеви грешки и/или рационални грешки. В случай на метафизални функции, фрактурите от раздробяване и остеопоротичната кост, клиничните резултати могат да се подобрят от връзката между ангуларно стабилни винтове/плаки.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Винтове за сакрум	Сакралните винтове на Synthes са предназначени за фиксация на задния таз, в зоната на задния горен или долнин гръбначен стълб, задния долн или долнин гръбначен стълб, за сакрални фрактури и фрактури от разместявания на сакроилиачната става.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Система от винтове за епифизиолиза на бедрената глава (SCFE)	Винтовете на скрития капитал на епифиза на тазобедрената става (SCFE) са предназначени за: <ul style="list-style-type: none"> - Скрит капитал на епифиза на тазобедрената става <p>Изделието не е одобрено за прикрепяне на винтове или фиксация на задни елементи (педикули) на цервикалната, торакалната или лумбалната част от гръбначния стълб.</p>	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Пружинни плаки 3,5	3,5 mm пружинна плака на Synthes е предназначена за тазова и ацетабуларна реконструктивна хирургия	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Стандартен изместващ винт DHS със LCP странична плака DHHS	<ul style="list-style-type: none"> - Пертохонтерни фрактури от тип 31-A1 и 31-A2 - Интертохонтерни фрактури от тип 31-A3 - Фрактури на феморалната шийка 31-B (DHS винт заедно с винт против завъртане) - Субтохонтерни фрактури 	<p>DHS не трябва да се използва в случаите, при които има високо разпространение на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сепсис - Първично злокачествени или метастатични тумори - Материално чувствителни - Съдово компроментирани

Системи	Показания	Противопоказания
Плаката за калканеус	Калканеалната плака се отнася до фрактурите на калканеуса. Калканеалната плака е показана за фрактури и остеотомии на калканеуса, включително, но не ограничено до външноставно, вътрешноставно понижение на ставата и фрактури тип език.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Заключващата плака за калканеус	Заключващата калканеална плака се отнася до сложните фрактури на калканеуса. Заключващата калканеална плака е показана за фрактури и остеотомии на калканеуса, включително, но не ограничено до външноставно, вътрешноставно понижение на ставата, фрактури тип език и силно раздробени фрактури.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
TomoFix	<p>TomoFix медиална висока тибиална и медиална висока тибиална плака за нисък ръст: С отворена и затворена клинообразна остетомия на медиалната проксимална тibia за лечение на: – Компартментална медиална или латерална гонартроза с разцентрованост на проксималната тибия – Идиопатична или посттравматична варус или валгус деформация на проксималната тибия</p> <p>TomoFix латерална плака на високата тибия: С отворена и затворена клинообразна остетомия на латералната проксимална тибия за лечение на: – Компартментална медиална или латерална гонартроза с разцентрованост на проксималната тибия – Идиопатична или посттравматична варус или валгус деформация на проксималната тибия</p> <p>TomoFix латерална плака на дисталната бедрена става: С отворена и затворена клинообразна остетомия на латералната дистална тазобедрена става за лечение на: – Компартментална медиална или латерална гонартроза с разцентрованост на дисталната бедрена става – Идиопатична или посттравматична валгус деформация на дисталната бедрена става</p>	Възпалителен артрит
TomoFix медиален дистален фемур (MDF)	Остеотомия със затворен клин на медиалната дистална тазобедрена става за лечение на: – Компартментална латерална гонартроза с валгус разцентрованост на дисталната бедрена става – Идиопатична или посттравматична валгус деформация на дисталната тазобедрена става – Допълнителна фиксация за фрактури на сложната дистална бедрена става	Възпалителен артрит
TomoFix медиална висока тибиална плака (MHT)	С отворена и затворена клинообразна остетомия на медиалната проксимална тибия за лечение на: – Компартментална медиална или латерална гонартроза с разцентрованост на проксималната тибия – Идиопатична или посттравматична варус или валгус деформация на проксималната тибия	Възпалителен артрит
VA-LCP система за травми на глезена 2,7/3,5	VA-LCP медиална дистална тибиална плака 2,7/3,5 Предназначена за сложни вътрешноставни и външноставни фрактури на дисталната тибия.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
	VA-LCP антеромедиална дистална тибиална плака 2,7/3,5 Предназначена за сложни вътрешноставни и външноставни фрактури на дисталната тибия.	
	VA-LCP антеролатерална дистална тибиална плака 2,7/3,5 Предназначена за сложни вътрешноставни и външноставни фрактури на дисталната тибия.	
	VA-LCP латерална дистална фибулна плака 2,7 Предназначена за фрактури и липса на свързвания в метафизалната и диафизалната област на дисталната фибула, особено при остеопеничната кост.	
	VA-LCP постеролатерални L- и T-плаки 2,7 Предназначена за поддръжка на частични артикуларни фрактури и костни фрагменти на дисталната тибия.	

Системи	Показания	Противопоказания
VA-LCP предна клавикуларна плака	<ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на вала на ключицата - Фрактури на латералната ключица - Лоши свързвания на ключицата - Липса на свързвания на ключицата 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
VA-LCP кондиларна плака 4,5/5,0	Системата VA-LCP кондиларна плака 4,5/5,0 на Synthes е предназначена за поддържащи мултифрагментални дистални фрактури на тазобедрената кост, включващи: супракондиларни, вътрешно и външноставни кондиларни фрактури, перипротезни фрактури, фрактури при нормалните и остеопеничните кости, липси на свързвания и лоши свързвания.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
VA-LCP плаки за дистален хумерус 2,7/3,5	<ul style="list-style-type: none"> - Външноставни фрактури на дисталния хумерус - Супракондиларни фрактури на дисталния хумерус - Липса на свързвания на дисталния хумерус - Остеотомии на дисталния хумерус (напр. поради лоши свързвания, деформации) 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
VA-LCP фузионни плаки за медиална колона 3,5	VA-LCP фузионните плаки за медиална колона 3,5 на DePuy Synthes са предназначени за деформации, тежки артрити и артози на медиалната колона, съставени от първата метатарзална, медиална клиновидна кост, навикуларни кости и талус.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
VA-LCP плаки за олекранон 2,7/3,5	<p>VA-LCP проксимална олекарна плака</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фрактури на проксималната олекарна - Остеотомии на олекранона за лечение на фрактура на дисталния хумерус <p>VA-LCP плаки за олекранон</p> <ul style="list-style-type: none"> - Външноставни фрактури на олекранон, включващи фрактури, разширяващи се в короноиди - Липса на свързвания на олекранона - Остеотомии на олекранона (напр. поради лоши свързвания, деформации) <p>VA-LCP плака на проксималната улна, външноставна</p> <ul style="list-style-type: none"> - Външноставни фрактури на проксималната улна - Липса на свързвания на проксималната улна - Остеотомии на проксималната улна (напр. поради лоши свързвания, деформации) 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
VA-LCP плака за проксимална тibia 3,5	Фрактури на проксималната тibia при възрастни и юноши със затворени за растеж плаки, включващи <ul style="list-style-type: none"> - Проксимално разделение, вдълбане или разделено-вдълбнати фрактури - Бикондиларни или чисти метафизални фрактури - Свързани метафизални или свързани осови фрактури - Перипротезни фрактури 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
VA заключваща плака за калканеус 2,7	VA заключваща плака за калканеус 2,7 Заключващите плаки за калканеус 2,7 с вариабилен ъгъл на Synthes са предназначени за вътрешно и външноставни фрактури на калканеуса, както и за деформации и лоши свързвания.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
	Преднолатерална заключваща плака за калканеус 2,7 с вариабилен ъгъл Преднолатералните заключващи плаки за калканеус 2,7 с вариабилен ъгъл на Synthes при комбинирана употреба с независими винтове са предназначени за вътрешно и външноставни фрактури на калканеуса, както и за деформации и лоши свързвания.	
VA-заключваща интеркарпална фузионна система	Предназначенa за фузии на малките кости на ръката, включващи: кукеста кост, главеста кост, полулунната кост и тристенната кост, за преглед на неуспешна частична фузия на китката и са показани за употреба при пациенти, страдащи от болка и/или загуба на функционалност поради: <ul style="list-style-type: none"> - Остеоартрит - Ревматоиден артрит - Посттравматичен или дегенеративен артрит на китката - Карпала нестабилност 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Фузионни LCP плаки с вариабилен ъгъл за 1^{та} MTP 2,4/2,7	Фузионни LCP плаки на система за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл за 1 ^{та} TMT 2,4/2,7 са предназначени при деформации на първата тарзометатарзална (TMT) става (Hallux Rigidus) и фрактури, липса на свързвания и реплантиране на първата метатарзална кост, особено при остеопеничната кост.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плака с вариабилен ъгъл за дорзален дистален радиус 2,4	LCP плаките с вариабилен ъгъл за дорзален дистален радиус 2,4 са предназначени за: <ul style="list-style-type: none"> - Дорзално разместени фрактури - Външноставни и вътрешноставни фрактури с метафизален дефект - Отворени ставни реконструкции - Комбинация от дистален радиус с карпали и метакарпали фрактури - Корективни остеотомии след лошо свързване на дисталния радиус 	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP система за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	Плаките за права фузия, плаките за Т-фузия, плаките за L-фузия, плаките за фузия с формата на детелина и X-плаките на системата за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл 2,4/2,7 са предназначени за фрактури, деформации, ревизии и реплантиране на кости (напр. тарзални, метатарзални и фаланги) и костни фрагменти, особено при остеопатичната кост.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.

Системи	Показания	Противопоказания
LCP мрежеста плака с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	Мрежестата плака, част от LCP системата за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл 2,4/2,7 е предназначена за фрактури, деформации, остри остеоартрити и липса или лоши свързвания за предна/средна част на ходилото, в частност при остеопатичната кост. В допълнение, мрежестата LCP плака с вариабилен ъгъл 2,4/2,7 на DePuy Synthes е показана за фиксация и стабилизация на фрактури на пателата в нормална и остеопенична кост при пациенти със завършен костен растеж.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP клиновидни плаки с отвори с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	LCP плаката с отворен клин на система за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл 2,4/2,7 е предназначена за деформации (напр. Hallux valgus), липса на свързвания и реплантиации на първата метатарзална кост, особено при остеопеничната кост.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP тарзални плаки с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	VA заключващи тарзални плаки на Synthes са предназначени за фиксация на фрактури, остеотомии, липса на обединения, реплантиации и фузии на кубоидната и навикалната кост, особено при остеопеничната кост.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP фузионни TMT плаки с вариабилен ъгъл 2,4/2,7	Фузионни LCP плаки на система за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл за 1 ^{та} TMT 2,4/2,7 са предназначени при деформации на първата тарзометатарзална (TMT) става (Hallux valgus) и фрактури, липса на свързвания и реплантиации на първата метатарзална кост, особено при остеопеничната кост. Фузионни LCP плаки на система за предна/средна част на ходилото с вариабилен ъгъл за TMT 2,4/2,7 са предназначени при деформации на втората и третата тарзометатарзална (TMT) стави и фрактури (Hallux valgus) и фрактури, деформации, липса на свързвания и реплантиации на втората и третата метатарзална кост, особено при остеопеничната кост.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP двуколонна плака за воларен дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4/стерилен комплект с дистален радиус	LCP дву-колоните воларните плаки за дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4 са предназначени за фиксация на вътрешно и външноставните фракути и остеотомии на дисталния радиус.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP двуколонна плака за воларен дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4/2,7 mm, свръхдълга	VA-LCP двуколонната плака за воларен дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4/2,7 mm, свръхдълга на DePuy Synthes е предназначена за външноставни и вътрешноставни фрактури, остеотомии, липса на свързвания и лоши свързвания на дисталния радиус с или без разширение към радиалната диафиза.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
LCP плака с воларен ръб за дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4	LCP воларните екстраартикуларни плаки за дистален радиус с вариабилен ъгъл 2,4 са предназначени за фиксация на сложни вътрешно и външноставни фракути на дисталния радиус.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.
Заключваща система за ръка с вариабилен ъгъл	Заключваща система за ръка с вариабилен ъгъл е предназначена за лечение на фрактури, деформации и дегенеративни заболявания на ръката.	Няма противопоказания, които да са специфични за тези изделия.

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com